

www.asl3.liguria.it

DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' FARMACEUTICHE
Struttura Complessa Assistenza Farmaceutica Convenzionata
Direttore: Dottoressa Adele COCCINI
Via Operai, 80 16149 GENOVA
Palazzo della Salute (Fiumara)
Tel. 0108497144-146 Fax 0108497076
e-mail: FarmaceuticaConvenzionata@asl3.liguria.it

Genova, li 30 OTT. 2015

Prot. n. 132070

Rif. Prot.

Ai Sigg. Medici MG

Al Direttore POU
Dottoressa Bruna **REBAGLIATI**

Al Direttore
Dipartimento Materno Infantile
Dott. G. **VALLERINO**

Al Direttore S.C. Cure Primarie
Dottor Lorenzo **BISTOLFI**

Ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari

Ponente n. 08
Dottor Filippo **PARODI**

Medio Ponente n. 09
Dottor Filippo **PARODI**

Val Polcevera e Valle Scrivia n. 10
Dottoressa Loredana **MINETTI**

Centro n. 11
Dottor Daniela **DALL'AGATA**

Val Bisogno e Val Trebbia n. 12
Dottoressa M. Romana **DELLEPIANE**

Levante n. 13
Dottor Carlo **NAVA**

e p.c. Al Direttore
Dipartimento Attività Farmaceutiche
Dottoressa Simonetta **NOBILE**

Loro Sedi

Oggetto: Progetto AIFA "Farmaci e Gravidanza"

Nell'ambito del progetto scientifico AIFA sul corretto uso dei farmaci in gravidanza, è stata condotta una revisione scientifica della più recente letteratura in merito ad alcuni farmaci Inibitori Selettivi della Ricaptazione della Serotonina (SSRI) presenti nel sito www.farmaciegravidanze.gov.it e sono state aggiornate le schede dei principi attivi impiegati per il trattamento dei disturbi d'ansia e depressivi in gravidanza e allattamento. In particolare sono, state riviste le schede tecniche dei principi attivi Citalopram, Escitalopram, Fluoxetina, Paroxetina,

Sertralina, Venlafaxina relativamente alle reazioni avverse associate all'utilizzo dei medicinali contenenti tali sostanze nei diversi trimestri di gestazione e in allattamento.

In generale, l'assunzione di farmaci SSRI nel secondo trimestre di gravidanza è stato correlato con un rischio aumentato di preeclampsia. Tale segnalazione è ancora in fase di studio, sia per i possibili fattori confondenti sia per la numerosità del campione studiato.

L'assunzione prolungata di antidepressivi SSRI nel terzo trimestre di gravidanza e in prossimità del parto, invece, può determinare rallentata crescita fetale e basso peso alla nascita, problemi di adattamento e sintomi di astinenza (tra cui tremori, irritabilità, disturbi del sonno, sindrome da stress respiratorio, ipoglicemia) di solito transitori.

Non è ancora confermata la possibile associazione tra assunzione materna di farmaci SSRI nell'ultimo periodo di gravidanza e ipertensione polmonare neonatale persistente (PPHN). Gli studi sono concordi che comunque il rischio sarebbe minimo.

Gli studi sugli effetti dell'esposizione a SSRI in gravidanza sullo sviluppo psico-motorio e cognitivo nel bambino sono rassicuranti, ma basati su piccoli campioni, mentre non è ancora definito il rischio di anomalie comportamentali. Sono necessari ulteriori studi prospettici a lungo termine che tengano conto anche dei fattori confondenti.

Quanto sopra ai fini degli adempimenti di competenza, con particolare attenzione alla divulgazione della nota a tutti i Medici prescrittori e agli specialisti.

La documentazione è anche consultabile sul sito Intranet della A.S.L. n. 3 "Genovese" sotto la voce Farmacovigilanza <http://www.farmacovigilanza.asl3.liguria.it> nel settore Note Informative.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Dottoressa Adele COCCINI)



AC/ma