

www.asl3.liguria.it

DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' FARMACEUTICHE
Struttura Complessa Assistenza Farmaceutica Convenzionata
Direttore: Dottoressa Adele COCCINI
Via Operai, 80 16149 GENOVA
Palazzo della Salute (Fiumara)
Tel. 0108497144-146 Fax 0108497076
e-mail: FarmaceuticaConvenzionata@asl3.liguria.it

Genova, li 19 SET. 2016.

Prot. n. 122293

Rif. Prot.

Ai Sigg. Medici MG e PLS

Al Direttore POU
Dottoressa M. CALTABELLOTTA

Al Direttore
S.C. Cure Primarie
Dottor Lorenzo BISTOLFI

Ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari

Ponente n. 08
Dottor Filippo PARODI

Medio Ponente n. 09
Dottoressa Daniela DALL'AGATA

Val Polcevera e Valle Scrivia n. 10
Dottoressa Loredana MINETTI

Centro n. 11
Dottor Carlo NAVA

Val Bisogno e Val Trebbia n. 12
Dottoressa M. Romana DELLEPIANE

Levante n. 13
Dottor Mario FISCI

E p.c. Al Direttore
Dipartimento Attività Farmaceutiche
Dott.ssa Simonetta NOBILE

Loro Sedi

Oggetto: Nota Informativa AIFA – ARCOXIA/ALGIX/TAUXIB/EXINEF riduzione della dose raccomandata giornaliera da 90 mg a 60 mg

In accordo con l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), le aziende titolari dei medicinali ARCOXIA/ALGIX/TAUXIB/EXINEF (etoricoxib) desiderano informarla su alcune importanti informazioni di sicurezza relative a tali medicinali e alla **riduzione da 90 a 60 mg** della dose raccomandata giornaliera per il trattamento dei pazienti affetti da artrite reumatoide (AR) e spondilite anchilosante (SA).

La posologia quindi attualmente approvata per il trattamento di AR e SA è la seguente:

La dose giornaliera raccomandata è di 60 mg in monosomministrazione. In alcuni pazienti con insufficiente sollievo dai sintomi, un aumento della dose a 90 mg in monosomministrazione giornaliera può aumentare l'efficacia. Una volta che il paziente è clinicamente stabilizzato, può essere appropriata una riduzione della dose a 60 mg in monosomministrazione giornaliera. In

assenza di un aumento del beneficio terapeutico devono essere prese in considerazione altre alternative terapeutiche.

Poiché i rischi cardiovascolari dell'etoricoxib possono aumentare con la dose e con la durata dell'esposizione, la durata del trattamento deve essere la più breve possibile e deve essere utilizzata la dose giornaliera minima efficace. La necessità di trattamento per il sollievo sintomatico e la risposta alla terapia devono essere rivalutati periodicamente, specialmente nei pazienti con osteoartrosi.

La documentazione è anche consultabile sul sito Intranet della A.S.L. n. 3 "Genovese" sotto la voce Farmacovigilanza <http://www.farmacovigilanza.asl3.liguria.it> nel settore Note Informative.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Dottoressa Adele COCCINI)

