

Struttura Complessa Assistenza Farmaceutica Convenzionata

Direttore f.f.: Dottoressa Simona BOTTINO
Via Operai, 80 16149 GENOVA
Palazzo della Salute (Fiumara)
Tel. 0108497144-146 Fax 0108497142 - 7076
e-mail: FarmaceuticaConvenzionata@asl3.liguria.it

Genova, li

30 GEN. 2019

Prot. n. 15254

Rif. Prot.

Ai Sigg. Medici MG e PLS

Al Direttore POU

Al Responsabile S.S.D.
Assistenza Sanitaria di base
Specialistica Metropolitana e Farmaceutica
Dottoressa Clara **CORDANO**

Al Direttore
S.S.D. Endocrinologia, Diabetologia e Malattie
Metaboliche
Dottor Enrico **TORRE**

Ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari

Ponente n. 08
Dottor Filippo **PARODI**

Medio Ponente n. 09
Dottoressa Loredana **MINETTI**

Val Polcevera e Valle Scrivia n. 10
Dottoressa M. Romana **DELLEPIANE**

Centro n. 11
Dottor Mario **FISCI**

Val Bisogno e Val Trebbia n. 12
Dottoressa Daniela **DALL'AGATA**

Levante n. 13
Dottor Marco **MACCHI**

E p.c.

Al Direttore Socio Sanitario
Dottor Lorenzo **SAMPIETRO**

Al Direttore
S.C. Farmacia Ospedaliera
Dott.ssa Simonetta **NOBILE**

Loro Sedi

Oggetto: Rischio di gangrena di Fournier (fascite necrotizzate del perineo) associato all'impiego di inibitori del co-trasportatore sodio-glucosio di tipo 2 (SGLT2i).

Con la presente si riporta la nota informativa importante concordata con le Autorità Regolatorie Europee e l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) inerente i principi attivi canaglifozin (Invokana®), dapaglifozin (Forxiga®), empaglifozin (Jardiance®).

Casi di gangrena di Fournier (fascite necrotizzate del perineo), riscontrati dopo l'immissione in commercio, sono stati associati all'uso di inibitori del SGLT2.

La gangrena di Fournier è un'infezione rara ma grave potenzialmente pericolosa per la vita.

La comparsa di infezioni urogenitale o di ascesso perineale può precedere l'insorgenza di fascite necrotizzante.

E' necessario raccomandare ai pazienti di richiedere urgenti cure mediche se manifestano forte dolore, dolorabilità, eritema o gonfiore nella zona genitale o perineale in associazione a febbre o malessere.

In caso di sospetta gangrena di Fournier, bisogna interrompere la somministrazione dell'inibitore del SGLT2 e avviare tempestivamente un trattamento (compresi antibiotici e sbrigliamento chirurgico).

Quanto sopra ai fini degli adempimenti di competenza, con particolare attenzione alla divulgazione a tutti i Medici Prescrittori.

La documentazione è anche consultabile per esteso sul sito Intranet della A.S.L. n. 3 "Genovese" sotto la voce Farmacovigilanza <http://www.farmacovigilanza.asl3.liguria.it> nel settore Note AIFA.

Distinti saluti.

Farmaceutica Convenzionata
Responsabile del Procedimento
Dottoressa Simona Borgna
Tel 010/8497158 – fax 010/8497142
E-mail: simona.borgna@asl3.liguria.it

Il Direttore f.f.
(Dottoressa Simona BOTTINO)

