www.asl3.liguria.it**Struttura Complessa Farmaceutica Territoriale**

Direttore: Dottoressa Simona BOTTINO

Via Operai, 80 16149 GENOVA

Palazzo della Salute (Fiumara)

Tel. 0108497144-146 Fax 0108497142

e-mail: FarmaceuticaConvenzionata@asl3.liguria.it

Genova, li

29 MAG. 2019

Prot. n

743-16

Rif. Prot.

29/05/2019

Ai Sigg. Medici MG e PLS

Al Direttore POU

Dott. Enrico **SIMONELLI**

Al Responsabile S.S.D.

Assistenza Sanitaria di base

Specialistica Metropolitana e Farmaceutica

Dottoressa Clara **CORDANO**

Ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari

Ponente n. 08

Dottor Filippo **PARODI**

Medio Ponente n. 09

Dottoressa Loredana **MINETTI**

Val Polcevera e Valle Scrivia n. 10

Dottoressa M. Romana **DELLEPIANE**

Centro n. 11

Dottor Mario **FISCI**

Val Bisagno e Val Trebbia n. 12

Dottoressa Daniela **DALL'AGATA**

Levante n. 13

Dottor Marco **MACCHI**

Al Direttore Socio Sanitario

Dottor Lorenzo **SAMPIETRO**

Al Direttore

S.C. Farmacia Ospedaliera

Dott.ssa Simonetta **NOBILE**

Loro Sedi

*E p.c.***Oggetto: Uso di farmaci contenenti fluorochinoloni e chemioprolifassi delle malattie invasive meningococciche.**

Il Ministero della Salute con nota prot. n. 0014191 del 15/05/2019, di pari oggetto, alla luce delle recenti comunicazioni di EMA e AIFA, sebbene la chemioprolifassi delle malattie invasive meningococciche non rientri tra le condizioni per le quali è raccomandato di evitare l'uso dei fluorochinoloni, ha ritenuto opportuno fare alcune precisazioni sia per prevenire eventuali effetti indesiderati sia per ridurre la diffusione dell'antibiotico-resistenza nei confronti di questa

importante classe di antibiotici che, talora, rappresentano la sola opzione terapeutica nei confronti di infezioni gravi e potenzialmente letali.

Poiché altri antibiotici sono disponibili per la profilassi post-esposizione delle infezioni meningococciche, si raccomanda di limitare l'uso dei fluorochinoloni ai casi in cui sia strettamente necessario, ovvero in caso di contatti stretti da sottoporre a profilassi ma con controindicazioni agli altri antibiotici indicati o di temporanea indisponibilità di questi ultimi.

Particolare prudenza deve essere prestata nella prescrizione di questi medicinali agli anziani, ai pazienti con compromissione renale, ai pazienti sottoposti a trapianto d'organo solido ed a quelli trattati contemporaneamente con corticosteroidi, poiché il rischio di tendinite e rottura di tendine indotte dai fluorochinoloni può essere maggiore in questi pazienti.

La Ciprofloxacina è raccomandata per la profilassi post esposizione dei contatti stretti dei casi di infezione da meningococco, come riportato anche nella circolare del Ministero della Salute "Prevenzione e controllo delle malattie batteriche invasive prevenibili con vaccinazione" del 9 maggio 2019.

Si ricorda che la profilassi post-esposizione deve essere limitata ai solli contatti stretti e con il presupposto che l'esposizione deve essere avvenuta non oltre i 7 giorni antecedenti l'inizio della sintomatologia.


La chemioprophilassi dei contatti stretti deve essere fornita prima possibile, dopo la diagnosi microbiologica di meningococco, idealmente prima del tempo minimo di incubazione e, preferibilmente, entro le 48 ore dall'esordio clinico del caso indice. I dati attualmente disponibili portano a ritenere che se somministrata dopo 14 giorni dall'inizio della malattia, essa ha utilità limitata.

Quanto sopra ai fini degli adempimenti di competenza, con particolare attenzione alla divulgazione a tutti i Medici Prescrittori.

La documentazione è anche consultabile per esteso sul sito Intranet della A.S.L. n. 3 "Genovese" sotto la voce Farmacovigilanza <http://www.farmacovigilanza.asl3.liguria.it> nel settore Note AIFA.

Cordiali saluti.

Il Direttore
(Dottorssa Simona BOTTINO)



Farmacutica Convenzionata
Responsabile del Procedimento
Dottorssa Simona Borgna
Tel 010/8497158 – fax 010/8497142
E-mail: simona.borgna@asl3.liguria.it

EP/ma