



# Asl3

Sistema Sanitario Regione Liguria

[www.asl3.liguria.it](http://www.asl3.liguria.it)

**Struttura Complessa Farmaceutica Territoriale**

Direttore: Dottoressa Simona BOTTINO

Via Operai, 80 16149 GENOVA

Palazzo della Salute (Fiumara)

Tel. 0108497144-146 Fax 0108497142

e-mail: FarmaceuticaConvenzionata@asl3.liguria.it

Genova, li

**2 SET. 2019**

Prot. n. *117941*

*Rif. Prot.*

Ai Sigg. Medici MG e PLS

Al Direttore POU

Dottoressa Marta **CALTABELLOTTA**

Al Responsabile S.S.D.

Assistenza Sanitaria di base

Specialistica Metropolitana e Farmaceutica

Dottoressa Clara **CORDANO**

Ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari

Ponente n. 08

Dottor Filippo **PARODI**

Medio Ponente n. 09

Dottoressa Loredana **MINETTI**

Val Polcevera e Valle Scrivia n. 10

Dottoressa M. Romana **DELLEPIANE**

Centro n. 11

Dottoressa Viviana **MAURO**

Val Bisagno e Val Trebbia n. 12

Dottor Mario **FISCI**

Levante n. 13

Dottor Marco **MACCHI**

*E p.c.*

Al Direttore Socio Sanitario

Dottor Lorenzo **SAMPIETRO**

Al Direttore

S.C. Farmacia Ospedaliera

Dott.ssa Simonetta **NOBILE**

Loro Sedi

**Oggetto:** Chiarimenti prescrizioni farmaci per la terapia della Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO).

Nei pazienti con BPCO, accertata con esame spirometrico, le Linee Guida Gold 2019 propongono modelli di trattamenti farmacologici diversificati in base a una valutazione che tiene conto sia dei sintomi riferiti dal paziente (mMRC e CAT™) che delle riacutizzazioni.



# Asl3

Sistema Sanitario Regione Liguria

In particolare, i pazienti che rientrano nei gruppi A, B e C le Linee Guida Gold 2019 consigliano sempre di iniziare la terapia con un solo broncodilatatore, riservando il ricorso alle associazioni solo nei casi di sintomi persistenti e/o di ulteriori riacutizzazioni (Vedi Tabella sottostante).

## ► TRATTAMENTO FARMACOLOGICO INIZIALE

≥2 riacutizzazioni moderate o ≥1 riacutizzazione con necessità di ricovero ospedaliero	<b>GRUPPO C</b>  LAMA	<b>GRUPPO D</b> LAMA o LAMA + LABA* o ICS + LABA** <small>*Considerare se il paziente è fortemente sintomatico (es. CAT &gt;20) **Considerare se eos ≥300</small>
	0-1 riacutizzazioni moderate (senza necessità di ricovero ospedaliero)	<b>GRUPPO A</b>  Un broncodilatatore
	mMRC 0-1 CAT <10	mMRC ≥2 CAT ≥10

**Definizione delle abbreviazioni:** eos: conta degli eosinofili nel sangue in cellule per microlitro; mMRC: questionario modificato del British Medical Research Council per la valutazione della dispnea; CAT™: COPD Assessment Test.

Visto che, secondo quanto presente in letteratura, gli ICS (corticosteroidi inalatori) possono causare effetti collaterali quali polmoniti e che l'effetto terapeutico è efficace solo nei pazienti con conta degli eosinofili nel sangue  $\geq 300$  cellule/ $\mu$ l (Gruppo D), il loro utilizzo dovrebbe essere riservato esclusivamente ai pazienti con conta eosinofila  $\geq 300$ .

Conformare le modalità prescrittive a Linee Guida Internazionali che garantiscano il più appropriato utilizzo in base alla Medicina Basata sulle Evidenze è un fattore essenziale per il miglioramento dello stato di salute del paziente e la ottimizzazione delle risorse sanitarie evitando eccessi di cura e utilizzo di farmaci senza adeguate prove a supporto.

Cordiali saluti.

Farmaceutica Convenzionata  
Responsabile del Procedimento  
Dottoressa Simona Borgna  
Tel 010/8497158 – fax 010/8497142  
E-mail: simona.borgna@asl3.liguria.it

Il Direttore  
(Dottoressa Simona BOTTINO)