


Direzione Generale

Da: Locatelli Walter <Walter.Locatelli@regione.liguria.it>
Inviato: mercoledì 18 marzo 2020 09:33
A: ASL1 Imperiese; ASL2 Savonese; Direzione Generale; ASL4 Chiavarese; ASL5 Spezzina; DG Galliera; DG Gaslini; DG OEI; DG San Martino; (dirsanitaria@gaslini.org); DS ASL 1 (dirsan@asl1.liguria.it); DS Asl 2 (ds.segr@asl2.liguria.it); Direzione Sanitaria; DS Asl 4 (direzione.sanitaria@asl4.liguria.it); DS Asl 5 (direttore.sanitario@asl5.liguria.it); DS Galliera (segreteriaads@galliera.it); DS OEI (direzione.sanitaria@oeige.org); DS san martino (direttore.sanitario@hsanmartino.it)
Cc: Toti Giovanni; soniaviale@me.com; Ansaldi Filippo; Zanetti Roberta
Oggetto: I: Indicazioni diagnostica
Allegati: Indicazioni Diagnostica 18 Marz2020.pdf

Cari direttori,
vi inviamo le nuove indicazioni per esecuzione dei test diagnostici per COVID19.
Si tratta di una nuova definizione volta ad aumentare la sensibilità al fine di ridurre rischio di infezioni nosocomiali e a protezione dei nostri colleghi operatori sanitari.
Ciao
Filippo Ansaldi
Walter Locatelli



Epidemia da CoViD-19 [“SARS-CoV-2”]: Indicazioni per l’esecuzione dei tamponi nasofaringei

Update 18 Marzo 2020

Nel rispetto della Circ. Min. 7922 del 9/3/2020, al fine di contestualizzare le indicazioni per l’esecuzione dei tamponi nasofaringei all’attuale quadro epidemiologico e alla necessità di stringente appropriatezza delle risorse a disposizione del SSR ligure, si riporta di seguito la tipologia di pazienti da prioritariamente sottoporre a diagnostica COVID-19.

“Copyright © 2020– A.Li.Sa. – vietata la copia, la riproduzione e la diffusione con ogni mezzo senza il consenso scritto dell’autore”.

Sono prioritariamente da sottoporre a diagnostica molecolare COVID-19:

- A. Paziente, che richieda il ricovero ospedaliero per qualsiasi causa con infezione respiratoria acuta (almeno un segno/sintomo di malattia respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria)
- B. Paziente già ricoverato per qualsiasi causa che presenta infezione respiratoria acuta (almeno un segno/sintomo di malattia respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria)
- C. Operatore Sanitario che presenta infezione respiratoria acuta (almeno un segno/sintomo di malattia respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria)

Se il paziente/operatore sanitario presenta la sintomatologia da almeno 7 giorni è possibile eseguire il test sierologico rapido per la ricerca anticorpale (si raccomanda di conservare il campione)