



# Asl3

Sistema Sanitario Regione Liguria

[www.asl3.liguria.it](http://www.asl3.liguria.it)

**Struttura Complessa Farmaceutica Territoriale**  
Direttore: Dottoressa Simona BOTTINO  
Via Operai, 80 16149 GENOVA  
Palazzo della Salute (Fiumara)  
Tel. 0108497144-146 Fax 0108497142  
e-mail: FarmaceuticaConvenzionata@asl3.liguria.it

Genova, li **19 MAG. 2020**

Prot. n. **64052**

*Rif. Prot.*

Ai Sigg. Medici MG e PLS

Al Direttore POU

S.S.D. Oncologia  
Dottor Mencoboni Manlio  
Dottor Canobbio Luciano

Al Responsabile S.S.D.  
Assistenza Sanitaria di base  
Specialistica Metropolitana e Farmaceutica  
Dottoressa Daniela **PEZZANO**

Ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari

Ponente n. 08  
Dottor Filippo **PARODI**

Medio Ponente n. 09  
Dottoressa Loredana **MINETTI**

Val Polcevera e Valle Scrivia n. 10  
Dottoressa M. Romana **DELLEPIANE**

Centro n. 11  
Dottoressa Viviana **MAURO**

Val Bisagno e Val Trebbia n. 12  
Dottor Mario **FISCI**

Levante n. 13  
Dottor Marco **MACCHI**  
Alle Direzioni Sanitarie

Az. Ospedaliera Universitaria  
**SAN MARTINO – IST**  
Largo R. Benzi, 10  
16132, Genova

Ente Ospedaliero  
**Ospedali GALLIERA**  
Mura delle Cappuccine, 14  
16128, Genova

**Ospedale Evangelico Internazionale**  
Corso Solferino, 1  
16122 Genova

**Istituto Giannina Gaslini**  
Largo G. Gaslini, 5  
16147 Genova

*E p. c.*

Al Direttore  
S.C. Farmacia Ospedaliera  
Dottoressa Simonetta **NOBILE**

Loro Sedi

**Oggetto: Zecovir, Brivirac (brivudina): tossicità potenzialmente fatale delle fluoropirimidine quando somministrate poco prima o contemporaneamente alla brivudina o usate entro 4 settimane dalla fine del trattamento con brivudina.**

Con Nota informativa del 12/05/2020 AIFA ha segnalato la tossicità potenzialmente fatale delle fluoropirimidine quando somministrate poco prima o contemporaneamente alla brivudina o usate entro 4 settimane dalla fine del trattamento con brivudina.

In sintesi si può verificare quanto segue:

- Possono verificarsi casi fatali in seguito all'interazione tra brivudina e fluoropirimidine (ad es. fluorouracile, capecitabina, tegafur, flucitosina).
- È necessario aspettare almeno 4 settimane dopo la fine del trattamento con brivudina prima di iniziare il trattamento con una fluoropirimidina. In molti casi, si sono verificati decessi quando questo periodo di attesa di 4 settimane non è stato rispettato (ad esempio, la brivudina è stata assunta nell'intervallo tra i cicli di fluorouracile).

Sono state adottate le seguenti misure:


- Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e l'etichettatura della confezione saranno modificati, per rafforzare l'importanza del rispetto dell'intervallo di 4 settimane tra il trattamento con brivudina e fluoropirimidina;
- Nella confezione sarà inclusa una scheda di allerta per il paziente, che evidenzierà le informazioni essenziali per i pazienti e gli operatori sanitari;
- Inoltre, verrà fornita una checklist al medico prescrittore per supportarlo nel verificare l'idoneità del paziente a ricevere il trattamento con brivudina.

Quanto sopra ai fini degli adempimenti di competenza con particolare attenzione alla divulgazione a tutti i Medici prescrittori.

La documentazione è anche consultabile per esteso sul sito Intranet della A.S.L. n. 3 "Genovese" sotto la voce Farmacovigilanza <http://www.farmacovigilanza.asl3.liguria.it> nel settore News.

Cordiali saluti.

Il Direttore  
Dottoressa Simona BOTTINO



Il Direttore Sottosanitario  
Dottor Lorenzo SAMPIETRO



Farmaceutica Convenzionata  
Responsabile del Procedimento  
Dottoressa Francesca GIANNONI  
Tel 010/8497151 - fax 010/8497142  
E-mail: [francescagiannoni@asl3.liguria.it](mailto:francescagiannoni@asl3.liguria.it)



FG/ma